

## Légende de la coupe Cénomaniens D5 Martigues.

a : urgonien- bancs décimétriques à métriques. Interlits plus argileux, peu épais, structure interne détritique ; niveaux plus riches en coquilles plus ou moins entières.

Trous de pholades

a1 : lentille argilocalcaire, décimétrique, épaisseur irrégulière, écrasée au cours de la diagénèse.

- Surface de ravinement , Cénomaniens au dessus avec croûte de fer.

1 : calcaire sablogréseux, passe à une siltite à lentilles calcaires.

2 : calcaire gréseux bioturbé, écrasé par la diagénèse.

3 : calcaire massif à rudistes remaniés.

4 : calcaire plus sableux en rognons, matrice argilosableuse, débris de fossiles.

Teinte jaunâtre, rouille au sommet. Pastilles argiloferrugineuses rouilles (voile en couche fine, fragmenté, roulé).

5 : siltite, calcaire à terriers, plus massif au sommet.

6 : siltite brunâtre en discordance de ravinement peu marquée.

7 : calcaire coquiller massif à rudistes. Boudins diagénétiques à la base.

7a : siltite.

7b : détritique coquiller intercalé.

7c : calcaire, débit en plaques irrégulières. Fossiles (coraux, pectens, oursins).

8 : bancs plus épais, plus réguliers, décimétriques à pluridécimétriques, fines passées en plaquettes, huîtres, oursins, coraux.

9 : calcaire, lumachelle à radiolites et débris.

10 : calcaire massif ; stratification peu marquée, fins débris et débris centimétriques.

Nérinée (gastéropode), lamellibranches. Passées plus détritiques. Ensemble hétérogène.

Se termine par une surface de ravinement peu visible dans la végétation.